

Beihilfenummer	Name, Vorname des Beihilfeberechtigten	Geburtsdatum
----------------	--	--------------

**Bescheinigung über das Vorliegen eines Ausnahmefalles bei nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln**



**Hinweis:** Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel sind für Erwachsene und Kinder nach Vollendung des 12. Lebensjahres grds. nicht beihilfefähig. Ausnahmsweise sind die Kosten für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel beihilfefähig, wenn sie bei der Behandlung schwerwiegender Erkrankungen als Therapiestandard gelten, als Begleitmedikation zwingend erforderlich sind oder zur Behandlung einer unerwünschten, schwerwiegenden Arzneimittelwirkung verordnet werden. Die Ausnahmefälle (schwerwiegenden Erkrankungen und das für die jeweilige Behandlung geltende Standardtherapeutikum) sind auf Seite 2 dieses Schreibens abgedruckt. Bitte füllen Sie dieses Formular vollständig aus, da sonst eine abschließende Bearbeitung durch die Beihilfestelle nicht möglich ist.

Bei **Name, Vorname, Geburtsdatum** liegt eine schwerwiegende Erkrankung vor

**Siehe Seite 2 (Nr. 1.1 bis 1.46)**

Bezeichnung des Arzneimittels (ggf. PZN)	Diagnose/ Erkrankungen	Nr. der umseitigen Liste der Ausnahmefälle (1.1 – 1.45)	Handelt es sich um ein Arzneimittel der Homöopathie oder Anthroposophie (Nr. 1.46)?
			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, als Therapiestandard? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, als Therapiestandard? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
			<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, als Therapiestandard? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

**Siehe Seite 2 (Nr. 1.47/ 1.48)**

Begleitarmittel (ggf. PZN)	Hauptarzneimittel (ggf. PZN)	Indikation/ Nachweis	
		<input type="checkbox"/> Das Arzneimittel ist als Begleitmedikation zum Hauptarzneimittel zwingend vorgeschrieben.	<input type="checkbox"/> Das Arzneimittel wird zur Behandlung folgender schwerwiegender, unerwünschter Arzneimittelwirkungen eingesetzt: <hr/> <hr/>

Ort, Datum	Stempel und Unterschrift der Ärztin oder des Arztes; der Heilpraktikerin/ des Heilpraktikers
------------	--

Standardtherapeutika bei schwerwiegenden Erkrankungen
1. Abführmittel nur zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden, Megacolon, Divertikolose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz, Opiat- sowie Opioidtherapie und in der Terminalphase;
2. Acetylsalicylsäure (bis 300 mg/Dosiseinheit) als Thrombozyten-Aggregationshemmer bei koronarer Herzkrankheit (gesichert durch Symptomatik und ergänzende nicht-invasive oder invasive Diagnostik) und in der Nachsorge von Herzinfarkt und Schlaganfall sowie nach arteriellen Eingriffen;
3. Acetylsalicylsäure und Paracetamol nur zur Behandlung schwerer und schwerster Schmerzen in Co-Medikation mit Opioiden;
4. Acidosetherapeutika nur zur Behandlung von dialysepflichtiger Nephropathie und chronischer Niereninsuffizienz sowie bei Neoblase, Ileumconduit, Nabelpouch und Implantation der Harnleiter in den Dünndarm;
5. Topische Anästhetika und/oder Antiseptika, nur zur Selbstbehandlung schwerwiegender generalisierter blasenbildender Hauterkrankungen (z. B. Epidermolysis bullosa hereditaria, Pemphigus);
6. Antihistaminika
6.1. nur in Notfallsets zur Behandlung bei Bienen-, Wespen-, Hornissengift-Allergien,
6.2. nur zur Behandlung schwerer rezidivierender Urticarien,
6.3. nur bei schwerwiegendem, anhaltendem Pruritus,
6.4. nur zur Behandlung bei persistierender allergischer Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik, bei der eine topische nasale Behandlung mit Glukokortikoiden nicht ausreichend ist;
7. Antimykotika nur zur Behandlung von Pilzinfektionen im Mund- und Rachenraum;
8. Antiseptika und Gleitmittel nur für Patienten mit Katheterisierung;
9. Arzneistofffreie Injektions/Infusions-, Träger- und Elektrolytlösungen sowie parenterale Osmodiuretika bei Hirnödem (Mannitol, Sorbitol);
10. Calciumverbindungen (mindestens 300 mg Calcium-Ion/Dosiereinheit) und Vitamin D (freie oder fixe Kombination) sowie Vitamin D als Monopräparat bei ausreichender Calciumzufuhr über die Nahrung
10.1. nur zur Behandlung der manifesten Osteoporose,
10.2. nur zur gleichzeitig zur Steroidtherapie bei Erkrankungen, die voraussichtlich einer mindestens sechsmonatigen Steroidtherapie in einer Dosis von wenigstens 7,5 mg Prednisolonäquivalent bedürfen,
10.3. bei Behandlung mit Bisphosphonaten, Parathormonrezeptor (PTHr1)-Agonisten, Denosumab und Romosozumab, wenn gemäß Fachinformation des Hauptarzneimittels die Gabe einer entsprechenden Begleitmedikation vorausgesetzt wird oder die Patientin oder der Patient darauf hinzuweisen ist, dass die Anwendung einer entsprechenden Begleitmedikation erforderlich ist;

Standardtherapeutika bei schwerwiegenden Erkrankungen
11. Calciumverbindungen als Monopräparate nur
11.1. bei Pseudohypo- und Hypoparathyreoidismus,
11.2. bei Behandlung mit Bisphosphonaten, Parathormonrezeptor (PTHr1)-Agonisten, Denosumab und Romosozumab, wenn gemäß Fachinformation des Hauptarzneimittels die Gabe einer entsprechenden Begleitmedikation vorausgesetzt wird oder die Patientin oder der Patient darauf hinzuweisen ist, dass die Anwendung einer entsprechenden Begleitmedikation erforderlich ist;
12. Levocartinin nur zur Behandlung bei endogenem Cartininmangel;
13. Citrate nur zur Behandlung von Harnkonkrementen;
14. Dinatriumcromoglycat (DNCG)haltige Arzneimittel (oral) nur zur symptomatischen Behandlung der systemischen Mastozytose;
15. E.coli Stamm Nissle 1917 nur zur Behandlung der Colitis ulcerosa in der Remissionsphase bei Unverträglichkeit von Mesalazin;
16. Eisen-(II)-Verbindungen als Monopräparate nur zur Behandlung von gesicherter Eisenmangelanämie;
17. Flohsamen und Flohsamenschalen nur zur unterstützenden Quellmittel-Behandlung bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Zustand nach ausgedehnter Darmresektion, insbesondere Kurzdarmsyndrom und HIV assoziierter Diarrhöen;
18. Folsäure und Folate nur bei Therapie mit Folsäureantagonisten sowie zur Behandlung des kolorektalen Karzinoms;
19. Ginkgo-biloba-Blätter-Extrakt (Aceton-Wasser-Auszug, standardisiert, 240 mg Tagesdosis) nur zur Behandlung der Demenz;
20. Glukokortikoide, topisch nasal nur zur Behandlung bei persistierender allergischer Rhinitis mit schwerwiegender Symptomatik;
21. Harnstoffhaltige Dermatika mit einem Harnstoffgehalt von mindestens 5 % als Monopräparate auch unter Einsatz von keratolytischen und feuchthaltenden Bestandteilen nur bei gesicherter Diagnose bei Ichthyosen, wenn keine therapeutischen Alternativen für die jeweilige Patientin oder den jeweiligen Patienten indiziert sind;
22. Iodid nur zur Behandlung von Schilddrüsenerkrankungen;
23. Iod-Verbindungen nur zur Behandlung von Ulcera und Dekubitalgeschwüren;
24. Kaliumverbindungen als Monopräparate nur zur Behandlung der Hypokaliämie;
25. Lactose und Lactitol nur zur Senkung der enteralen Ammoniakresorption bei Leberversagen im Zusammenhang mit der hepatischen Enzephalopathie;
26. Lösungen und Emulsionen zur parenteralen Ernährung einschließlich der notwendigen Vitamine und Spurenelemente;

### Standardtherapeutika bei schwerwiegenden Erkrankungen

27. Magnesiumverbindungen, oral, nur bei angeborenen Magnesiumverlustkrankungen;
28. Magnesiumverbindungen, parenteral, nur zur Behandlung bei nachgewiesenem Magnesiummangel und zur Behandlung bei erhöhtem Eklampsierisiko;
29. Mistel-Präparate, parenteral, auf Mistellektin normiert, nur in der palliativen Therapie von malignen Tumoren zur Verbesserung der Lebensqualität;
30. Niclosamid nur zur Behandlung von Bandwurmbefall;
31. Nystatin (oral) nur zur Behandlung von Mykosen bei immunsupprimierten Patientinnen und Patienten;
32. Ornithinaspartat nur zur Behandlung des hepatischen (Prä-)Coma und der episodischen, hepatischen Enzephalopathie;
33. Pankreasenzyme (aus dem Pankreas gewonnene Enzyme), ausgenommen in fixer Kombination mit anderen Wirkstoffen, nur zur Behandlung chronischer, exokriner Pankreasinsuffizienz oder Mukoviszidose sowie zur Behandlung der funktionellen Pankreasinsuffizienz nach Gastrektomie bei Vorliegen einer Steatorrhoe;
34. Phosphatbinder nur zur Behandlung der Hyperphosphatämie bei chronischer Niereninsuffizienz und Dialyse;
35. Phosphatverbindungen bei Hypophosphatämie, die durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann;
36. Salicylsäurehaltige Zubereitungen (mindestens 2 % Salicylsäure) in der Dermatotherapie als Teil der Behandlung der Psoriasis und hyperkeratotischer Ekzeme;
37. Synthetischer Speichel nur zur Behandlung krankheitsbedingter Mundtrockenheit bei onkologischen oder Autoimmun-Erkrankungen;
38. Synthetische Tränenflüssigkeit bei Autoimmun-Erkrankungen (Sjögren-Syndrom mit deutlichen Funktionsstörungen [trockenes Auge Grad 2], Epidermolysis bullosa, okuläres Pemphigoid), Fehlen oder Schädigung der Tränendrüse, Fazialisparese oder bei Lagophthalmus;
39. Vitamin B6 (als Monopräparat) nur zur Behandlung von angeborenen pyridoxinabhängigen Störungen mit schwerwiegender Symptomatik;
40. Vitamin E (als Monopräparat) nur zur Behandlung von Vitamin-E-Mangel-Ataxie (AVED);
41. Vitamin K als Monopräparate nur bei nachgewiesenem, schwerwiegenden Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann;
42. Wasserlösliche Vitamine auch in Kombinationen nur bei der Dialyse;
43. Wasserlösliche Vitamine, Benfotiamin und Folsäure als Monopräparate nur bei nachgewiesenem, schwerwiegendem Vitaminmangel, der durch eine entsprechende Ernährung nicht behoben werden kann (Folsäure: 5mg/Dosiereinheit);

### Standardtherapeutika bei schwerwiegenden Erkrankungen

44. Zinkverbindungen als Monopräparate nur zur Behandlung der enteropathischen Akrodermatitis und durch Dialysebehandlung bedingten nachgewiesenem Zinkmangel sowie zur Hemmung der Kupferaufnahme bei Morbus Wilson;
45. Arzneimittel zur sofortiger Anwendung
  - 45.1. Antidote bei akuten Vergiftungen,
  - 45.2. Lokalanästhetika zur Injektion,
  - 45.3. apothekenpflichtige, nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die im Rahmen der ärztlichen Behandlung zur sofortigen Anwendung in der Praxis verfügbar sein müssen.
46. Arzneimittel der **Anthroposophie** und **Homöopathie** für die unter Punkt 1.1 bis 1.44 aufgeführten Indikationsgebiete, sofern die Anwendung dieser Arzneimittel für diese Indikationsgebiete nach dem Erkenntnisstand als Therapiestandard in der jeweiligen Therapierichtung angezeigt ist.
47. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die begleitend zu einer medikamentösen Haupttherapie mit zugelassenen, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähigen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation), sind verordnungsfähig, wenn das nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als **Begleitmedikation** zwingend vorgeschrieben ist.
48. Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, die zur Behandlung der beim bestimmungsgemäßen Gebrauch eines zugelassenen, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähigen Arzneimittels auftretenden schädlichen unbeabsichtigten Reaktionen (**unerwünschte Arzneimittelwirkungen**; UAW) eingesetzt werden, sind verordnungsfähig, wenn die UAW schwerwiegend sind.